Hipoglicemia Neonatal

Nasceu?

1 hora de vida = primeira mamada no CCG ou CPN

Tem condição de ALCON imediato?

SIM → Alojamento conjunto com mãe

NÃO → Cegonha e aguarda dieta por 6h
Priorizar ficar com mãe em 6h

RISCO DE HIPOGLICEMIA

Rastreio sem uso de HV

Se em uso de HV dx 6/6 ou 8/8h

Prematuro / PIG
Dx: 3, 6, 12, 24 e 48h
Manter por mínimo 48h!
Se 48h > 60 = suspende rastreio

Filho de mãe DMG / GIG
Dx: 1, 3, 6, 12, 24 e 48h
Manter por mínimo 24h!
Se 24h > 50 = suspende rastreio

valores normais

0-48 HDV: > 50
> 48HDV: > 60

DX ALTERADA

Assintomático

SE CRÍTICA:
0-4 HDV: < 25
<24 HDV: < 35
ou se 3 dietas e < 45

VIG 4-6

Internar
Hemograma, pcr
(Infecção? Policitemia?)

Glicose gel dextrose 40%
0,5 ml/kg/dia
+
Aleitamento materno

ou

LMO/LHP/Fórmula

Sintomático

Convulsão
Tremores
Letargia
Apneia
Cianose
Hipotermia

Bólus EV
2 ml/kg SG 10%
VIG 5-8

Internar
Hemograma, pcr (Infecção?
Policitemia?)
Eletrólitos (DHE?)

REAVALIA A CADA 45-60MIN

Se VIG > 12 ou CH > 160
ou
> 3 dias

PERSISTENTE
INTERNAR
CATETER VENOSO CENTRAL
INVESTIGAR
CONSIDERAR OUTRAS MEDICAÇÕES